

### ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Нельзя самостоятельно вызывать рвоту у детей без сознания и в случаях, если вы совершили не знаете, чем мог отравиться ребенок, и не видите признаков, указывающих на возможную причину.

Нельзя заниматься самолечением при отравлении. В случае отравлений всегда лучше вызвать, чем не вызвать врача.

Нельзя давать антидоты без консультации врача, даже, казалось бы, самые «безвредные». Например, молоко можно давать при отравлении кислотами и щелочами, а вот если разбавить молоком, поступивший в организм бензин, яд впитается быстрее.

Нельзя забывать о себе. Если ребенок отравился химическими или летучими веществами, угарным газом, прежде чем оказывать ему помощь, обезопасьте себя: при необходимости наденьте перчатки, откроите окна и т.д. Эти меры – проявление заботы о ребенке, потому что, если и вы пострадаете, кто поможет ему?

Нужна помощь? Мы с Вами рядом!

ОГБУ ДО «Центр «МОСТ»,

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35

Т: 8 (42622) 6-02-11, 8 (42622) 3-82-00

Единый общероссийский номер телефона доверия для детей, подростков и родителей:

**8-800-2000-122**

АНОНИМНО, круглосуточно, конфиденциально!



## ЗАЩИТИ СВОЕГО РЕБЕНКА ОТ ГАЗОВОЙ ТОКСИКОМАНИИ



В ГРУППЕ РИСКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ

Токсикомания –  
вздыхание паров  
химических веществ,  
прием лекебных,  
биологических  
препаратов с целью  
получения  
одурманивающего  
состояния организма.

Сниффинг – газовая  
такое же заболевание,  
как алкоголизм и  
наркомания.  
однократное вдыхание  
токсичного газа может  
привести к смерти.

Как это работает  
При вдыхании газы вытесняют кислород, что в  
итоге вызывает в мозге гипоксию – кислородное  
голодание, что создаёт психodelичные эффекты –  
уводящие в забытье, фантазии, галлюцинации.

г. Биробиджан, 2021 г.

## ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО ЕГО

1. Доступно. Газ для зажигалок всегда можно свободно купить в любом горючом павильоне.
2. Невысокая цена.
3. После вдыхания газа быстро наступает эффект опьянения.
4. Легко поддается маскировке. После употребления газов не остается запаха и их действие проходит быстро.

## ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

1. Различные неядовитые газы при неблагоприятном стечении обстоятельств могут вызвать сердечную аритмию, которая в течение нескольких минут приводит к смерти.
2. Быстро вызывает привыканье и со временем не приносит нужного «каифа».
3. Происходит нарушение функций мозга и легких.
4. Боли в мышцах, судороги.
5. Возможны кровотечения.
6. Возникают головокружение, вплоть до потери сознания.
7. Наступает отмирание тканей пищевода и желудочно-кишечного тракта.

## ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Истощение физических и психических сил организма.
2. Отёк мозга, снижение успеваемости и умственных способностей, слабоумие.
3. Депрессия.
4. Обострение хронических заболеваний.
5. Попросток способен панести вред окружающим, так как паникующий газ, ребенок не контролирует себя.
6. Появляется тяга к более сильным химическим и наркотическим веществам.
7. Цирроз печени.
8. Инвалидность.
9. Смерть.



## ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЮ

1. Создать доброжелательную атмосферу дома.
2. Надавить контакт с ребенком.
3. Внимательно отнеситесь к окружению ребенка, его занятости.
4. Необходимо обратить внимание на поведение ребенка.
5. Постарайтесь рассказать ребенку доступным и понятным для него языком о влиянии на организм и психику человека психоактивных веществ.
6. Не запускайте!
7. Появились тревожные знаки, обратитесь к психиатру.

## Родители насторожитесь, если:

- ребёнок заснул в непривычное для него время;
- долго спит во время дневного сна без видимой причины;
- заторможен или излишне возбуждён, беспокоен;
- ходит, пошатываясь, если раньше уже ходил уверенно;
- невнятно говорит, если раньше речь была отчётливая;
- взглядно нарушилась координация движений;
- ребёнок необычно бледен, поглив, или, наоборот, кожа сухая, покрасневшая;
- у ребёнка снижена температура тела;
- у ребёнка обильное слюноотделение или сухость во рту;
- сужены или чрезмерно расширены зрачки, широка зрачков не соответствует освещению (известно, что при ярком свете зрачки сужаются, в темноте – расширяются).

## Более опасные симптомы, свидетельствующие о возможном отравлении:

- спутанность сознания, галлюцинации;
- судороги, потеря сознания;
- нарушение ритма сердца, слабый, частый или редкий пульс;
- повышенное, шумное, учащенное или редкое дыхание;
- измененное, шумное, учащенное или редкое дыхание.

## При отравлении или малознакомом подозрении на него:

- немедленно вызовите «Скорую помощь», вынесите (вынесите) его на свежий воздух, ни в коем случае не занимайтесь самолечением;
- попытайтесь выяснить возможную причину отравления, если вы не знаете ее достоверно; расспросите ребенка, если он уже может объяснять, осмотрите его от огня, лицо, одежду на предмет обнаружения специфических запахов, пятен, покраснений и ожогов кожи и слизистой;
- осмотрите место, где он был недавно, потенциально опасные места в вашем доме (запечку, место, где хранился бытовая химия). Вспомните, не пользовались ли вы в течение дня какими-либо препаратами, не оставили ли их в доступном месте. Не давали ли ребёнку какие-нибудь лекарства, не заканчивали ли капли в нос, не были ли вчера или сегодня в гостях, не приходили ли гости к Вам;
- если ребенок без сознания, у него может наступить удушье от задыхающей язвка или от попадания рвотных масс в дыхательные пути. В этом случае лучше уложить ребёнка на бок, контролируйте пульс и дыхание до приезда «скорой». При необходимости очистите пальцем, обернутым в платок, рот от рвотных масс и следите, чтобы возможная рвота не препятствовала дыханию;
- соберите необходимые для госпитализации ребенка вещи.